

Longoncologie behandeling NSCLC studies: NVALT 24 MEDI4736/placebo

12NAT02068

Adjuvante behandeling, na curatieve resectie en evt adjuvante chemotherapie
MEDI4736/placebo 13 keer à 4 weken. Behandeling duurt 12 maanden

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: MEDiplabo : 2 uur
	Dosisreductie: niet toegestaan		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		923750	immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

Registratieformulier: vul studiecode in: **LO65** dus geen ILOP!!!

datum	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						a. controles		
	01:00	MEDI4736/placebo In 250 ml NaCl 0,9% <i>studie-aanvraag nodig!</i>	20 mg/kg	mg		0,2 µm filter a. controles		
	00:30					b. observatie a. controles		

Verpleegkundige toedien-instructies

- a. controles na minimaal 5 minuten rust. Binnen 30 minuten voor start infusie, 30 minuten na start infusie, na einde infusie en na observatie. Noteren op **controlelijst**. Ook **start- en stoptijd noteren**.
- b. observatie: op infusiereacties

anti-emetica thuisadvies:

geen

Achtergrondinformatie studies NSCLC NVALT 24 MEDI4736/placebo

Informatie over de studie:

- een fase III prospectieve dubbel-blinde placebo-gecontroleerde gerandomiseerde studie met adjuvante MEDI4736 na complete resectie van een NSCLC met/zonder adjuvante chemotherapie.
- Tumor-evaluatie: 6-wekelijks

Informatie over de geneesmiddelen:

- MEDI4736: een humaan monoklonaal antilichaam tegen PD-L1. Het blokkeert de PD-1 pathway. Hiermee wordt voorkomen dat de PD1 de T-cel productie stopt. De T-cellen nemen toe in aantal en richten zich op de tumorcellen.
 - Bijwerkingen die zouden kunnen voorkomen: infusie gerelateerde bijwerkingen, enterocolitis, dermatitis, hepatotoxiciteit of hepatitis, endocrinopathie, neuropathie of neurologische bijwerkingen, pancreatitis, pneumonitis en andere infecties, vermoeidheid, misselijkheid, diarree, verminderde eetlust, huiduitslag, jeuk.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Studie-informatie uitgereikt door onderzoeksarts of researchnurse

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Geen anti-emetica

Contact:

- Onderzoeksarts: prof. dr. H.J.M. Groen 55759
- Researchnurse: Thea Scholtens 47012

Controlelijst: NSCLC NVALT 24: MEDI4736/placebo

Kuur:.....

Datum:.....

Sticker patiëntgegevens

start- en stoptijden medicatie:

starttijd MEDI4736/placebo:.....uur

stoptijd MEDI4736/placebo:.....uur

	Tijdstip invullen	RR	Pols	Temp	Paraaf
Vooraf (na min 5 min rust en binnen 30min start infusie)					
30min na start infusie					
Na inloop infusie					
Na 30min observatie					

Bijzonderheden:

Evt premedicatie noteren: